



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. 61. 24. 06. 51

PUBLICATION PERIODIQUE

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL : 160 F.

BULLETIN N° 10 DU 8 JUIN 1990

Nouveau n° de téléphone du S.R.P.V. : 61.24.70.70 - N° d'appel direct de la Section "GRANDES CULTURES" : 61.24.70.33

TOURNESOL

PHOMOPSIS

Situation

Des sorties d'ascospores continuent à être observées dans la totalité des pièges du réseau (cf. notre dernier bulletin n° 9 du 16 mai) depuis la mi-mai après chaque pluie. Les tout premiers symptômes de la maladie ont été observés à la fin mai à DONNEVILLE (31) en situation exceptionnellement favorable (semis précoce, précédent tournesol, variété traditionnelle).

Préconisation

* Parcelles ayant reçu une application

. Variétés tolérantes

Il est inutile de renouveler l'intervention.

. Variétés traditionnelles

Renouveler l'intervention au plus tard au stade "bouton étoilé" du tournesol, en respectant si possible un délai de trois semaines entre les deux applications.

Produits utilisables pour ce traitement :

- PUNCH C	à	0,8 l/ha
- CORBEL BASF	à	0,8 l/ha
- CORBEL QUINO	à	0,8 l/ha
- CORBEL DUO	à	1,6 l/ha
- PELTAR FLO	à	7 l/ha

* Parcelles non traitées à ce jour

. Variétés traditionnelles

Réaliser d'urgence une intervention au fur et à mesure de l'arrivée des cultures au stade "6 feuilles étalées".

Produits utilisables pour ce traitement :

- PELTAR FLO	à	7 l/ha
- PUNCH C	à	0,8 l/ha

Sur ces variétés traditionnelles, une deuxième intervention sera à prévoir dans les mêmes conditions que celles définies à la rubrique précédente (parcelles ayant reçu une application).

Des conseils vous seront donnés dans nos prochains bulletins.

Variétés tolérantes

Une intervention dans les mêmes conditions de réalisation que celles définies au chapitre précédent (variétés traditionnelles) sera à réaliser uniquement dans parcelles à forts risques (végétation abondante, terres fertiles, séquence pluvieuse importante dans les jours précédents).

Nous rappelons que toute reproduction du texte contenu dans les Avertissements Agricoles est soumise à notre autorisation. Il est interdit, en particulier, d'en tirer des extraits à des fins commerciales.

MAIS

SESAMIE

Situation

Le premier vol de papillons se poursuit toujours.
Un maximum de ce vol a été observé dans la période du 20 au 30 mai.
Les dégâts en cultures sont constatés depuis deux semaines.

Préconisation

*Dans les cultures les plus tardives non traitées à ce jour, assurer la protection dans les conditions définies dans notre précédent bulletin (n° 9 du 16 mai).
A la liste des produits utilisables, ajouter :*

- KARATE à 0,3 l/ha

NOCTUELLES

Situation

Des captures de papillons sont signalées depuis le 28 mai dans des pièges installés à L'ISI EN-DODON et VILLEMUR (31).
Le risque de dégâts de vers gris existe toujours.

Préconisation

*Surveiller les dégâts dans les parcelles.
Intervenir selon les indications données dans notre précédent bulletin.*

PYRALE

Le premier vol de papillons n'a pas encore débuté.
Toute intervention est inutile.